



# **AME DE** FORMA SEGURA.

Platiquemos sobre la viruela símica.

La viruela símica es una infección viral cuyos síntomas pueden incluir una erupción o úlceras dolorosas e incómodas, suele ir acompañada de una enfermedad similar a la gripe. La viruela símica puede ser grave y requerir hospitalización, especialmente en personas con otras afecciones de salud o personas inmunodeprimidas.

Cualquier persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, puede contraer la viruela símica mediante el contacto estrecho y personal con alguien que tiene los síntomas. Sin embargo, los datos sugieren que el virus se ha propagado principalmente entre las redes de hombres homosexuales, bisexuales y amantes del mismo género a través del contacto íntimo. El riesgo es especialmente alto en hombres amantes del mismo género con múltiples compañeros sexuales o con compañeros anónimos.

# ¿Qué más debo saber?



## **Vacunas**

Actualmente, la vacuna contra la viruela símica, JYNNEOS, es una vacuna de dos dosis, la segunda de las cuales se administra 28 días después de la primera. La vacuna contra la viruela símica se puede administrar en la mayoría de los departamentos de salud locales y en las oficinas de los proveedores de atención médica en Illinois.



## **Tratamiento**

En este momento, el medicamento principal disponible para el tratamiento de la viruela símica es un antiviral llamado tecovirimat o TPOXX, y se recomienda principalmente para pacientes que son más propensos a enfermarse gravemente, como los pacientes con sistemas inmunitarios debilitados.



## **Síntomas**

Las personas con viruela símica a menudo tienen un sarpullido que puede estar ubicado en las manos, los pies, el pecho, la cara o la boca o cerca de los genitales, incluidos el pene, los testículos, los labios, la vagina y el ano. El período de incubación es de 3 a 17 días. Otros síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares o dolor de espalda, dolores de cabeza, ganglios linfáticos inflamados, agotamiento o síntomas respiratorios.



## **Pruebas**

Además de la viruela símica, existen muchas causas para la erupción cutánea. Si tiene una erupción cutánea, con o sin síntomas que la acompañen (como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares o ganglios linfáticos agrandados), se recomienda que se comunique con su proveedor médico para hacerse la prueba de viruela símica.

**Envíe MpoxES+ tu** código postal al 36363

para obtener información sobre su centro de vacunación más cercano.



Escanee el código **QR** para obtener más información y encontrar recursos locales sobre la viruela símica.

